

Prøvetakning for SARS-CoV-2 (COVID-19)

UTSTYR PR. PASIENT

1x pakke UTM
med 1 pensel



PRØVETAKNING


NB!

Samme pensel brukes *først* i hals, så i nasopharynx.



HALS

Penselen **strykes og roteres** over bakre svelgvegg og tonsiller (mandlene)




NASOPHARYNX


Penselen føres **HELT bak** til naso-pharynx



La penselen ligge i **minimum** 10 sekunder



Penselen roteres 360°, før den trekkes ut



Plasser penselen i mediet og brekk av pinnen i brekkpunktet



MOTTAK AV PASIENT MED MISTENKT / SANNSYNLIG ELLER BEKREFTET SYKDOM*, BEKLEDNING OG SMITTEVERNTILTAK

Se DocMap; prosedyre **PR1422**, punkt 4.3 for mottak av pasient og plakat **RL7686** for bekledning.

* Søk opp «Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus» ved www.fhi.no

10.03.20 anbefalte FHI at **alle pasienter med luftveissymptomer som innlegges i sykehus skal testes for SARS-CoV-2**, uavhengig av reiseanamnese. Asymptomatiske skal **IKKE** testes. Ved slik indikasjon er ekstra smitteverntiltak **IKKE** nødvendig dersom pasienten **ikke** har andre indikasjoner for dette!

REKVISISJONEN

MÅ inneholde et direkte telefonnummer til rekviert (vakttelefon) slik at positive prøvesvar kan ringes ut.

KLINISKE OPPLYSNINGER

«INNLAGT PAS. MED LUFTVEISSYMPTOMER»

Dersom kritisk sykdom – SKRIV DETTE for prioritering, men IKKE misbruk dette begrepet.

BESTILLE ANALYSE

Skriv «SARS-CoV-2 eller COVID19» på rekvisisjonen på linjen bak punktet «annet» under luftveisprøver.

Vi har et mål om at prøver som ankommer lab. før 09.00, svares ut i løpet av samme døgn, men dette er avhengig av kapasiteten i laboratoriet.

Før innsending til laboratoriet

Prøveglassene må vaskes/tørkes med desinfiserende **sprit**, og **MERKES FØR** det sendes til mikrobiologen ved Nordlandssykehuset, Bodø.